



معهد دسمان للسكري
Dasman Diabetes Institute



أحد مراكز
Center



العائلة الدوائية:

مثبطات SGLT-2

المادة الفعالة:

الاسم العلمي لدواء Forxiga® هو Dapagliflozin
الاسم العلمي لدواء Jardiance® هو Empagliflozin

طريقة عمل الدواء:

يمنع امتصاص السكر عن طريق الكلى ويساعد بذلك على التخلص من السكر الزائد مع البول.

الأعراض الجانبية:

- التبول المتكرر
- قد يسبب التهابات المسالك البولية أو التناسلية.
- العطش



معهد دسمان للسكري
Dasman Diabetes Institute



أحد مراكز
Center

معلومات متعلقة باستعمال الدواء:

- من الممكن تناول الدواء قبل أو بعد الأكل. يفضل أن يؤخذ كل يوم في نفس الوقت.
- يفضل تناول الدواء في النهار حتى لا يقلق المنام في الليل عند الحاجة للذهاب إلى دورات المياه.
- قد يسبب الجفاف إذا لم يتم تناول كميات مناسبة من الماء (أو حسب إرشادات الطبيب المعالج).
- لا يسبب هذا الدواء هبوط في السكر بشكل مباشر، و لكن قد تكون هناك فرصة للهبوط إذا تم تناوله بالإضافة للأدوية الأخرى.
- يمكن أن يسبب نقصاً بالوزن في حالات زيادة الوزن.
- قد يُستخدم هذا الدواء لتقليل خطر حدوث الوفاة القلبية و مضاعفات القلب و الأوعية الدموية لدى مرضى قصور القلب و لو لم يكن لديهم داء السكري.