



معهد دسمان للسكري
Dasman Diabetes Institute



المجموعة الدوائية:

مشابهات هرمون GLP-1

المادة الفعالة:

الاسم العلمي لدواء **Semaglitde هو Rybelsus®**

هي اول حبة تؤخذ عن طريق الفم من مجموعة مشابهات هرمون GLP-1

دواعي الاستخدام

السكري النوع الثاني

هرمون GLP-1

1. يساعد الجسم على افراز المزيد من الانسولين عند تناول الطعام
2. يقلل من كمية السكر التي يفرزها الكبد
3. يبطئ حركة المعدة مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة اطول

الاثار الجانبية

- * غثيان و تقيؤ
- * اسهال او امساك
- * عسر هضم
- * تعب او ارهاق
- * التهاب في البنكرياس



معهد دسمان للسكري
Dasman Diabetes Institute



موانع الاستخدام

- *الحساسية من الدواء أو أي مكون من التركيبة
- *تاريخ شخصي أو عائلي بالاصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي
- *الحمل أو الرضاعة

يتوفر الريبالسس بأكثر من تركيز



طريقة الاستخدام

- يتم تناول الدواء على معدة فارغة، قبل 30 دقيقة على الأقل من الأكل أو الشرب أو أي أدوية تؤخذ عن طريق الفم، مع \geq نصف كوب من الماء فقط
- ابتلع الحبة كاملة لا تقم بتقسيمها أو مضغها

طريقة التخزين

- تخزن الحبوب في علبتها الأصلية بين درجة حرارة 20-25 درجة سيليزية
- لا تقم تخزينه في الثلاجة و تحفظ عن الرطوبة