

الأدوية الخافضة للسكر

مجموعة مثبطات (SGLT-2)



CONTACT US

SWITCHBOARD: + (965) 2224 2999

HOTLINE: + (965) 1877 877

FAX: + (965) 2249 2436

OR VISIT US AT: www.dasmaninstitute.org

الأدوية الخافضة للسكر

مجموعة مثبطات (SGLT-2)

تنقسم الخيارات العلاجية للسكري من النوع الثاني إلى عدة مجموعات دوائية وتألف كل مجموعة من عدة أدوية التي تعمل على خفض السكر. تساعد هذه الأدوية على السيطرة على مستويات السكر في الدم والحفاظ عليها بمعدلات طبيعية أو أقرب للطبيعية. كما تقوم بتخفيف الأعراض التي قد يشعر بها الشخص المصاب نتيجة ارتفاع مستوى سكر الدم، وتساعد كذلك على منع أو تأخير الإصابة بمضاعفات السكري وتحسين جودة الحياة وهو الهدف الجوهري للجوء إلى العلاج الدوائي.

فور تشخيص الإصابة بالسكري من النوع الثاني، يبدأ الطبيب المعالج بتصميم الخطة العلاجية. وهناك العديد من الخيارات الدوائية المتاحة لتحسين مستوى سكر الدم بالإضافة لاتباع نمط حياة صحي. يعتمد اختيار الأدوية الخافضة للسكري على عدة عوامل منها:



آلية عمل
الدواء



الوزن



التاريخ المرضي
للمصاب



تكلفة الدواء
المادية



التدخل الدوائي
مع أدوية أخرى قد
يكون الشخص
يتناولها



فوائد ومخاطر
استخدام الدواء

المجموعات الدوائية المستخدمة للسكري من النوع الثاني:

- بيجوانايدز 
- مثبطات (SGLT-2) 
- مشابهات هرمون (GLP-1) 
- مثبطات إنزيم (DPP-4) 
- محفزات البنكرياس 
- مجموعة مشابهات هرموني (GLP-1 و GIP) 



تصنف الأدوية الخاضعة للسكري إلى مجموعات مختلفة حسب طريقة عملها. تحتوي كل مجموعة على دواء أو عدة أدوية. قد تتطلب السيطرة على السكري من النوع الثاني عادة تناول أدوية متعددة التي تعمل بطرق مختلفة لضبط مستويات سكر الدم. من هذه الأدوية ما يؤخذ عن طريق الفم

مجموعة مثبطات (SGLT-2)

الشكل الصيدلاني:
أقراص تؤخذ عن طريق الفم



المنتجات المتوفرة

الأدوية المتوفرة بهذه المجموعة



forxiga
(dapagliflozin)

28 tablets



10 mg



Invokana™
canagliflozin tablets
Oral use
100 mg

28 tablets



الاسم العلمي
Dapagliflozin داباجلifieFloزين



الاسم التجاري
Forxiga



الاسم العلمي
Canagliflozin كاناجلifieFloزين




الاسم التجاري
Invokana انفوكانا



Steglatio®

Filmtabletten
Ertugliflozin

98 Filmtabletten



Jardiance®

10 mg
film-coated tablets
Empagliflozin

Oral use
30 film-coated
tablets

الاسم العلمي
Ertugliflozin ارتوجلifieFloزين



الاسم التجاري
Steglatio



الاسم العلمي
Empagliflozin امباجلifieFloزين



الاسم التجاري
Jardiance جارديانس





دواعي الاستعمال



- السكري من النوع الثاني
- الخيار المفضل في حالات السكري من النوع الثاني والتعرض لخطر الإصابة أو الإصابة بأمراض القلب والشرايين



موانع الاستعمال

- 
- حالات الحماض الكيتوني السكري

آلية العمل

يمنع إعادة امتصاص السكر عن طريق الكلوي ويساعد بذلك على التخلص من السكر الزائد مع البول.



تحسن من السيطرة
على السكر

تحسن نتائج القلب والأوعية
الدموية المستهدفة


تحسن
الوزن

تقلل
ضغط
الدم

تقلل خطورة الإصابة
بجلطات الدماغ

تحسن نتائج الوظائف
الكلوية المستهدفة





معلومات متعلقة بالدواء

لا يسبب هبوط سكر الدم بشكل مباشر، ولكن قد تكون هناك فرصة للإصابة بالهبوط إذا تم تناوله بالإضافة للأدوية الأخرى الخافضة لسكر.

قد يسبب الجفاف إذا لم يتم تناول كميات مناسبة من الماء (قد يوصي الطبيب المعالج بتناول كميات محددة من الماء في بعض الحالات).

شروط التخزين

يخزن في درجة حرارة الغرفة بحيث لا تتجاوز 25 درجة سيليزية، بعلبة محكمة الإغلاق وبعيداً عن الشمس والحرارة الشديدة والرطوبة (لا تخزن الأدوية في دورات المياه).

نقاط ارشادية



ممكن تناول الدواء قبل أو
بعد الوجبات



يفضل تناول الدواء كل يوم
بنفس الوقت



يفضل تناول الدواء في فترة
النهار حتى لا يتسبب بقلق
المنام ليلاً عند الحاجة للذهاب
إلى دورة المياه بشكل متكرر



يجب حفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول يد الأطفال



ملاحظات

لتلقي استفساراتكم **والرسائل التوعوية الأسبوعية**
الصادرة من وحدة التثقيف والتدريب في معهد دسمان
للسكري، ومتابعة أنشطة وفعاليات الوحدة، يرجى حفظ
رقم الواتس اب التابع للوحدة على جهاز الهاتف الخاص بكم:



وإرسال رسالة نصية

"أرغب بالمشاركة"

مع الاعتذار عن عدم الرد على أي استفسار يتعلق بالمواقع
في أي من عيادات المعهد التخصصية أو الخدمات الأخرى
التي يقدمها المعهد.



مع تحيات

قسم التثقيف والتدريب في معهد دسمان للسكري