

Diagnostic Imaging Center مركز الأشعة التشخيصية

Post Procedure Instructions for Patient Receiving I.V. Contrast التحضيرات والتعليمات الخاصة للمرضى بعد أخذ الصبغة الوريدية

Date of Exam:

تاريخ الفحص:

Time:

الوقت:

Name of Procedure:

اسم الفحص:

Contrast Name

اسم الصبغة المستخدمة للفحص:

Please read the following instructions carefully before leaving the Imaging Center:

الرجاء قراءة التعليمات التالية الخاصة قبل مغادرة قسم الأشعة:

1. Drink (at least 1 Liter) of water over the next 24 hours.

1. يرجى شرب (لا يقل عن 1 لتر) من الماء خلال 24 ساعة القادمة.

2. If you are on fluid restrictions, contact your doctor for instructions to help clear any residual contrast materials from your body.

2. إذا كنت تتبع إرشادات بعدم استهلاك السوائل بكثرة، اتصل بطبيبك للحصول على الإرشادات للمساعدة في إزالة أي مواد متبقية من الصبغة في الجسم.

3. If you develop any tightness in your throat or chest pain, shortness of breath, extreme dizziness, itchiness, hives, or other unexplainable symptoms, please go to the nearest hospital.

3. إذا حصل لديك حساسية، ضيق في الحلق، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، الدوخة الشديدة، الحكة، أو أية أعراض غير قابلة للتفسير، يرجى مراجعة أقرب مستشفى بشكل عاجل.

4. **Only for Iodine Contrast:**

4. **لحالات الصبغة الملونة (اليود):**

- Diabetic patients taking Glucophage/ Metformin should discontinue medication on the day of the procedure.
- Repeat your renal function test after 48 hours. Show the result to your doctor and follow his advice about resuming your Glucophage / Metformin.

- ينبغي لمرضى السكري وقف الجلوكوفاج أو (ميتفورمين) في يوم إجراء الفحص.
- إعادة فحص وظائف الكلى بعد 48 ساعة من عمل فحص الأشعة بالصبغة وأخذ النتيجة إلى الطبيب المعالج والعمل بنصيحته حول أخذ الجلوكوفاج أو (ميتفورمين).

5. **Breast-feeding:** Mothers are advised not to breast-feed their babies for 24 hours after contrast material has been administered.

5. **في حالة الرضاعة الطبيعية :** ينصح للأمهات بعدم إرضاع الأطفال لمدة 24 ساعة بعد أخذ الصبغة الوريدية.